



HIPOCLORITO SÓDICO LA CHARRA APTO

Notificado de conformidad con la Disposición Transitoria Segunda del RD

1054/2002



DESCRIPCIÓN:

Disolución acuosa de hipoclorito sódico de 150 g de cloro/litro (12,5% cloro activo). CAS: 7681 – 52 – 9
Producto para tratamiento de agua de consumo (TP5) para uso profesional, a base de Hipoclorito Sódico 12,5% de cloro activo. **APTA CLORACION AGUA DE CONSUMO.**

MODO DE EMPLEO:

La dosificación deberá ser la suficiente para alcanzar una concentración de cloro libre residual según la legislación vigente. La dosificación sería de 4gotas, 2cc ó 20cc para un volumen de agua de 10L, 100L O 1000L, respectivamente.

FORMA DE PRESENTACIÓN:

Estado físico a 20 °C: Líquido Aspecto: Característico
Color: Amarillento Olor: A cloro

FORMATOS:

20 L, Jc polietileno ó 1000L IBC

En caso de accidente o peligro para la salud, acuda a su médico o consulte al **INSTITUTO NACIONAL DE TOXICOLOGÍA. Telf.: 91 562 04 20.**

RECOMENDACIONES PARA CASO DE INTOXICACIÓN O ACCIDENTE:

Las manifestaciones clínicas que se pueden producir en caso de exposición y/o contacto son: De irritación a corrosión de ojos, piel, mucosas, tracto respiratorio y gastrointestinal. Disfagia, Sialorrea y vómitos (Hematemesis después de grandes ingestiones). Edemas de glotis, neumonías, broncoespasmo, edema pulmonar y neumonía por aspiración.

MEDIDAS BÁSICAS DE ACTUACIÓN:

Requerir asistencia médica inmediata, mostrándole la FDS de este producto. En caso de inhalación, sacar al afectado fuera del lugar de exposición, suministrarle aire limpio y mantenerlo en reposo. En contacto con la piel, quitar la ropa y zapatos contaminados, aclarar la piel y lavar con agua abundante y jabón neutro sin frotar. En contacto con los ojos, lavar con agua abundante al menos durante 15 minutos. No olvide retirar las lentillas si no están pegadas al ojo. Evitar que el afectado se frote o cierre los ojos. En caso de ingestión, NO provoque el vómito. Enjuagar la boca y la garganta, ya que han podido ser afectadas en la ingestión. Consejos terapéuticos para médicos y personal sanitario: En caso de ingestión, no se recomienda vaciado gástrico, valorar la realización de endoscopia. Contraindicaciones: Carbón Activado y neutralización con ácidos y bases. Tratamiento sintomático y de soporte.

FABRICADO

LA CHARRA – C/ HOYAMOROS 16 NAVE 4 POL. IND. MONTALVO II 37008 SALAMANCA

VERSIÓN: 20/12/2024