



HIPOCLORITO SÓDICO LA CHARRA ESPECIAL PISCINA

REGISTRO 18-60-09359



DESCRIPCIÓN:

Disolución acuosa de hipoclorito sódico de 157 g de cloro/litro (12,8% cloro activo). **CAS: 7681 – 52 – 9**
Producto para tratamiento de agua de piscina (TP2) para uso profesional, a base de Hipoclorito Sódico 12,8% de cloro activo.

MODO DE EMPLEO:

Antes de usar el producto, léase detenidamente la etiqueta. No utilizar en ningún caso en presencia de bañistas. Ventílese adecuadamente antes de entrar en el recinto (en caso de piscina cubierta, spa, etc.) No podrá mezclarse con otros productos químicos, incompatible con ácidos, materias comburentes, amonio y compuestos amoniacales.

Ajustar el pH del agua entre 7.2 y 7.6. Añadir el Hipoclorito Sódico mediante bomba dosificadora. El tratamiento químico se podría realizar en el propio vaso en una proporción aproximada de 2 ó 3 litros por cada 100m³ de agua, siempre, previo cierre del vaso y con ausencia de bañistas en el mismo, garantizando un plazo de seguridad antes de su nueva puesta en funcionamiento. Comprobar con el test analizador el nivel de cloro, que se debe mantener siempre dentro de los límites legislados.

FORMA DE PRESENTACIÓN:

Estado físico a 20 °C: Líquido. Aspecto: Característico .
Color: Amarillento. Olor: A cloro.

FORMATOS: 10L, 20 L, Jc polietileno ó 1000L IBC

RECOMENDACIONES PARA CASO DE INTOXICACIÓN O ACCIDENTE:

Las manifestaciones clínicas que se pueden producir en caso de exposición y/o contacto son: De irritación a corrosión de ojos, piel, mucosas, tracto respiratorio y gastrointestinal. Disfagia, Sialorrea y vómitos (Hematemesis después de grandes ingestiones). Edemas de glotis, neumonías, broncoespasmo, edema pulmonar y neumonía por aspiración.

En caso de accidente o peligro para la salud, acuda a su médico o consulte al **INSTITUTO NACIONAL DE TOXICOLOGÍA. Telf.: 91 562 04 20.**

MEDIDAS BÁSICAS DE ACTUACIÓN:

Retire a la persona de la zona contaminada y quite la ropa manchada o salpicada. En contacto con los ojos, lavar con agua abundante al menos durante 15 minutos. No olvide retirar las lentillas si no están pegadas al ojo. En contacto con la piel, lave con agua abundante y jabón sin frotar. En caso de ingestión, NO provoque el vómito. Si la persona puede tragar saliva, no se produce tos y la ingesta es inferior a una hora, realizar enjuagues bucales con agua. Mantenga el paciente en reposo y conserve la temperatura corporal. Controle la respiración. Si fuera necesario, respiración artificial. Si la persona está consciente, acuéstela de lado con la cabeza más baja que el resto del cuerpo y las rodillas semiflexionadas. Si es necesario, traslade al intoxicado a un centro hospitalario, y siempre que sea posible lleve la etiqueta o el envase. NO DEJE SOLO AL INTOXICADO EN NINGÚN MOMENTO.

FABRICADO POR: LA CHARRA – C/ HOYAMOROS 16 NAVE 4 POL. IND. MONTALVO II 37008 SALAMANCA.